

EduCARE

Lavagna

15/03/2016

Quando Correre?



Paura di:

- Non interpretare correttamente la situazione
- Conseguenze

Patologie o malattie

Coriza/Rinite/Raffreddore

Paura delle parole

Febbre

- 38°C se il bambino è < 3 mesi di età
- 39°C se il bambino è > 3 anni di età



Cosa fare

Misurare la temperatura

Somministrare antipiretici

Paracetamolo

15-20 mg/kg per bocca

Ogni 6-8 ore

Durata

- 24 ore
- 3 giorni esantema
 - 5 giorni

Sintomi associati

Vomito/diarrea

Disidratazione

Calo del peso corporeo

Espresso in % rispetto al peso noto
precedente

Disidratazione lieve 5-7% del peso

Disidratazione intermedia 7-10% del peso

Disidratazione grave > 10% del peso

Ad es un bambino che pesava 10 kg prima dell'inizio e al controllo ne pesa 9
ha perso il 10% del suo peso

Cosa fare

Se disidratazione lieve o
intermedia

Soluzione reidratante per
bocca

Se disidratazione grave



In ospedale



Soluzione reidratante per bocca
Reidratazione per via ev

Difficoltà di respiro (Dispnea)

Nasarcamento

Alitamento

Tirage


Cornage



Si vede a occhio nudo e si ascolta
senza fonendo

Cosa fare

Bambino nella posizione più confortevole



Trasportato da 118 in Ospedale

Dolore addominale



Quando il bambino
sta fermo


Non è partecipe

Non guarda la mamma

Alterna fasi di sofferenza a fasi di apatia
e letargia

Cosa c'è che non va


**Riflette
adeguatezza
di
ossigenazione
ventilazione
perfusione
cerebrale
SNC
omeostasi**



**Riflette
adeguatezza
di
vie aeree
ossigenazione
ventilazione**

**Riflette adeguatezza di gittata cardiaca e perfusione
periferica**

A colpo d'occhio



Grazie per
l'attenzione